

Vad är emtricitabin/tenofoviridisoproxil för preexponeringsprofylax (PrEP)?

Emtricitabin/tenofoviridisoproxil är ett receptbelagt läkemedel som minskar risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv) hos vuxna och ungdomar i åldern 12 till under 18 år som väger minst 35 kg när det tas dagligen och kombineras med säkrare sex.

Vad du behöver veta innan och medan du tar emtricitabin/tenofoviridisoproxil för att minska risken för hiv-1-infektion

Du måste vara hiv-negativ innan du börjar ta emtricitabin/tenofoviridisoproxil för PrEP för att minska risken för hiv. Emtricitabin/tenofoviridisoproxil kan endast minska risken för hiv innan du smittats. Du måste testa dig för att säkerställa att du inte redan har en hiv-1-infektion. Ta inte emtricitabin/tenofoviridisoproxil för att minska din infektionsrisk om det inte har bekräftats att du är hiv-negativ.

Berätta för läkaren om eventuella influensaliknande symtom, antingen under månaden innan behandling inleds med emtricitabin/tenofoviridisoproxil eller när som helst medan du tar emtricitabin/tenofoviridisoproxil. Om du har haft sex som utsatt dig för risken för hiv, kan dessa vara tecken på en hiv-infektion:

- TRÖTTHET
- FEBER
- LED- ELLER MUSKELVÄRK
- HUVDVÄRK
- KRÄKNING ELLER DIARRÉ
- UTSLAG
- NATTSVETTNING
- FÖRSTORADE LYMFKÖRTLAR I HALSEN ELLER LJUMSKEN

Ta emtricitabin/tenofoviridisoproxil enligt din läkares anvisningar. Missa inte någon dos eller sluta ta emtricitabin/tenofoviridisoproxil. Att missa doser eller att inte ta tabletten såsom läkaren ordinerat ökar risken för hiv och kan orsaka resistens mot läkemedlet om du får en hiv-infektion.

- Testa dig regelbundet för hiv (t.ex. minst var tredje månad)
- Berätta omedelbart för din läkare om du tror att du infekterats med hiv. Läkaren kan vilja utföra flera tester för att säkerställa att du fortfarande är hiv-negativ.
- **Att bara ta emtricitabin/tenofoviridisoproxil förhindrar eventuellt inte att du får hiv. Du måste fortsätta att utöva säkert sex när du tar emtricitabin/tenofoviridisoproxil för att minska risken att få hiv:**
 - Använd kondom för att minska kontakten med sädesvätska, vaginalvätskor eller blod och för att undvika att utsättas för andra sexuellt överförda infektioner
 - Dela inte personliga artiklar där det kan finnas blod eller kroppsvätskor, t.ex. tandborstar och rakblad
 - Dela inte, eller återanvänd inte nålar eller annan injicerings- eller läkemedelsutrustning
- **Vidta åtgärder för att undvika infektion när du tar emtricitabin/tenofoviridisoproxil för PrEP:**

- Låt dig testas för andra sexuellt överförda infektioner som syfilis och gonorré. Dessa infektioner gör det lättare för dig att infekteras med hiv.
- Få information och stöd för att minska ett sexuellt beteende som kan utsätta dig för en högre risk
- **Du behöver känna till din status vad gäller infektion med hepatit B-virus (HBV) innan du påbörjar behandlingen med emtricitabin/tenofoviridisoproxil:**

Om du har en HBV-infektion föreligger en allvarlig risk att leverproblemen kan försämrans efter att du avslutar behandlingen med emtricitabin/tenofoviridisoproxil

Hur du tar emtricitabin/tenofoviridisoproxil

Ta alltid emtricitabin/tenofoviridisoproxil enligt läkarens anvisningar. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- Rekommenderad dos av emtricitabin/tenofoviridisoproxil för att minska risken för humant immunbristvirus (hiv) är en tablett emtricitabin/tenofoviridisoproxil en gång dagligen. Ta emtricitabin/tenofoviridisoproxil varje dag, inte bara när du tror att du utsatts för risken för en hiv-infektion. Emtricitabin/tenofoviridisoproxil skall tas tillsammans med föda närhelst så är möjligt.
- För att komma ihåg att ta emtricitabin/tenofoviridisoproxil kan du lägga in en påminnelse i din mobil eller i någon annan enhet som kan påminna dig om när det är dags att ta emtricitabin/tenofoviridisoproxil
- Missa inte någon dos eller sluta ta emtricitabin/tenofoviridisoproxil såvida inte läkaren säger åt dig att göra det. Missade doser kan öka risken för att du får en hiv-infektion. Om du missar en dos emtricitabin/tenofoviridisoproxil och du upptäcker det:
 - Inom 12 timmar efter den tidpunkt då emtricitabin/tenofoviridisoproxil vanligtvis tas, ta då tablett så snart som möjligt, helst med föda. Ta sedan nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt.
 - 12 timmar eller fler efter den tidpunkt då emtricitabin/tenofoviridisoproxil vanligtvis tas, glöm bort den missade dosen. Vänta och ta nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt, helst med föda.
- Om du kräks inom mindre än 1 timme efter en dos emtricitabin/tenofoviridisoproxil, ta en ny tablett. Du behöver inte ta en ny tablett om du kräks efter mer än 1 timme efter det att du tagit emtricitabin/tenofoviridisoproxil

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan emtricitabin/tenofoviridisoproxil orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Läs bipacksedeln som finns in läkemedelsförpackningen för en fullständig förteckning över

möjliga biverkningar.

Emtricitabin/tenofoviridisoproxil kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive nytillkomna eller förvärrade njur- och skelettproblem. Innan och under behandlingen kan läkaren ordinera blodprov för att kontrollera din njurfunktion. Informera din läkare om du tidigare har haft njursjukdomar eller **om prover har visat att du har njurproblem eller om du tror att du har några av de allvarliga biverkningar som listas i bipacksedeln.**

Mycket vanliga biverkningar hos personer som tar emtricitabin/tenofoviridisoproxil inkluderar: diarré, kräkningar, illamående, yrsel, huvudvärk, utslag och svaghet.

Informera din läkare om du har några biverkningar som besvärar dig eller inte försvinner. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Hur emtricitabin/tenofoviridisoproxil ska förvaras

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn
- Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter {Utg.dat}. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad
- Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tillslut flaskan väl.

VIKTIG INFORMATION

Viktig information om emtricitabin/tenofoviridisoproxil för att minska risken för hiv-infektion hos personer som har förskrivits emtricitabin/tenofoviridisoproxil för PrEP

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Kontakt

Avdelningen Tillomed Medical Information på:

Tel: +44 (0) 1480 402400

E-post: Medical.information@tillomed.com